



经济及社会理事会

Distr.: Limited
20 March 2001
Chinese
Original: English

麻醉药品委员会
第四十四届会议
议程项目 7(e)
国际药物管制条约的执行情况：
与国际药物管制条约有关的其他事项

斯洛伐克：决议草案

促进合理使用苯并二氮杂卓

麻醉药品委员会，

考虑到需充分实施 1971 年《精神药物公约》¹并特别铭记该公约的序言，

还考虑到国际麻醉品管制局 1999 年报告的第 170、171 和 172 段，²

又考虑到国际麻醉品管制局 2000 年报告第 12、15、175 和 176 段，³

满意地注意到 2001 年 1 月 29 日和 30 日欧洲委员会蓬皮杜小组与一个专家组举行会议，审查了与合理使用苯并二氮杂卓有关的问题，

苯并二氮杂卓的治疗用途和合理使用

1. 认识到苯并二氮杂卓对治疗的用处和重要性，并认为，尽管苯并二氮杂卓的不当使用造成滥用和过量，但还是利大于弊，理应将其保留在药房中；

2. 注意到欧洲委员会 1990 年 10 月 18 日关于苯并二氮杂卓处方的 AP(90)3 号决议仍然具有意义，特别是对下述事项：

- (a) 需进行医疗调查并提供苯并二氮杂卓处方的诊断依据；
- (b) 确定最短时期内的准确指征和处方；
- (c) 中断不必要的治疗；

¹ 联合国，《条约汇编》第 1019 卷，第 14956 号。

² 联合国出版物，出售品编号：E.00.XI.1。

³ 联合国出版物，出售品编号：E.01.XI.1。

- (d) 尽量使用最低剂量；
- (e) 司机和机器操作员发生事故的风险；
- (f) 建议不与苯并二氮杂卓同时使用酒精或使用可能与苯并二氮杂卓发生相互作用的精神药品；

二

对医疗专业和制药专业人员以及其他有关人员的培训

强调对医疗专业和制药专业人员（医生、药剂师、护士等）进行有关适当使用苯并二氮杂卓的初期培训和在职培训的重要性。这种培训应当包括诊断工具、停止治疗的方法和介绍替代治疗方法或替代药品；

三

对患者的说明

建议由患者密切参与治疗过程。医生和药剂师应当向其患者强调严格遵守处方剂量的重要性。（在不会引起不适当好奇的情况下）向用药者说明使用和滥用苯并二氮杂卓可能引起的问题；

四

制药工业的作用

1. 希望制药工业参与确保适当使用苯并二氮杂卓的努力，敦促其除其他外做到如下：

- (a) 在登记任何可能投放市场的药品时提供关于药物滥用和依赖性潜在可能性的研究报告；
- (b) 向公众提供较小包装的药量（一周到二周的治疗用量）并为苯并二氮杂卓成瘾者戒毒治疗所用药品提供适当的制药配方和剂量；
- (c) 遵守关于促销苯并二氮杂卓的职业道德守则；

2. 认识到制药工业在为保健专业人员提供资料，特别是提供治疗中断规程资料方面所起的重要作用；

五

与分析实验室的行业合作

吁请制药工业与分析实验室进行合作，例如通过提供参照药物和适当的分析方法对苯并二氮杂卓进行分析研究；

六

研究

强调加强研究尤其是医学研究(有关人与药物)和社会学研究(医生与病人关系以及药物与人之间联系)的重要性,以便加深对流行病学的了解,发现问题并寻找与苯并二氮杂卓的使用、滥用和供应有关的解决办法;

七 戒毒

1. 尤其重视戒毒问题这样一个与使用苯并二氮杂卓有关的重点问题。应考虑到下述三点内容:

- (a) 任何处方都应从一开始就对治疗终止期作出规定;
 - (b) 应使用既定的戒毒程序安排;
 - (c) 应改建现有的治疗中心或建立新的专门治疗中心;
2. 强调有关戒毒的说明应能确保病人或医生不会轻易放弃戒毒;

八 统计数字

提请当局注意统计数字及对统计数字进行分析的益处。了解正在变化的趋势及和进行国内和国际比较可有助于战略的拟订;

九 监测

请主管当局制定类似方法的工具,监测任何滥用情况或由于用药特别是使用苯并二氮杂卓而可能产生的药物依赖性;

十 不适当的苯并二氮杂卓处方和配方

注意到保健人员在苯并二氮杂卓用药上处方和配药不当可能是造成误用这些药物的一个重要因素。监管机构对这类情况不应宽容,对严重或一再违规的应考虑提起诉讼;

十 非法使用

关注在受害者不知情的情况下非法使用苯并二氮杂卓的情况。具有催眠作用的苯并二氮杂卓药剂应通过使用染色剂或具有某种特殊气味的添加剂防止在受害者不知情的情况下非法使用苯并二氮杂卓。当局应将这类事项告知专业人员和公众;

十二 监管措施

认为监测和监管是打击误用苯并二氮杂卓的重要武器。对滥用后而造成严重公共健康问题的那些药物，为防止其误用和非法贩运，应在地方和国际各级采取更为严格的措施（包括处方和配药、打击非法贩运的措施、戒药等）。