



经济及社会理事会

Distr.: Limited
12 March 2008
Chinese
Original: English

麻醉药品委员会

第五十一届会议

2008年3月10日至14日，维也纳

议程项目 4(a)

减少毒品需求：《实施减少毒品需求指导
原则宣言行动计划》

美利坚合众国：决议修订草案

吸用大麻的后果：再度加强针对青年人的预防、教育和治疗工作

麻醉药品委员会，

回顾会员国在大会第二十届特别会议通过的《政治宣言》中承认解决世界毒品问题的行动是共同的集体责任，这要求采取统筹兼顾的办法，¹正如《减少毒品需求指导原则宣言》²和促进国际合作解决世界毒品问题的措施³中所阐明的，这种办法使管制供应和减少需求得以相互加强，

还回顾在《政治宣言》中，会员国承诺它们到 2008 年在减少需求领域取得重大的、可衡量的成果，⁴

强调大麻是世界范围生产、贩运和消费最为广泛的非法毒品之一，

注意到一些会员国报告说，室内种植大麻的供应有所增加，大麻的四氢大麻酚含量平均水平也有总体上扬，

¹ 大会 S-20/2 号决议，附件，第 2 段。

² 大会 S-20/3 号决议，附件，第 4 和第 8 段。

³ 大会 S-20/4 号决议，A 至 E。

⁴ 大会 S-20/2 号决议，附件，第 17 段。



回顾《1961 年麻醉品单一公约》⁵第 38 条，其中要求公约缔约国特别注意并采取一切切实措施预防吸毒和对所涉人员进行早期发现、治疗、教育和善后护理，

关切地注意到所报道的一些国家中因吸用大麻而需要进行戒毒治疗的青年人数，

注意到近期开展的关于吸用大麻与某些精神失常症状间关联的研究，

还注意到一些研究证明，吸用大麻危害呼吸道包括可能引发肺癌，

忆及吸用大麻后驾车的有害后果，

1. **呼吁**会员国和有关国际组织继续提高青年人和成年人对吸用大麻的健康危害的认识；

2. **请**会员国交流关于为防止儿童和青年人吸用大麻以保护这些易受害人群免受与吸用大麻有关的健康危害而采取的有效循证战略和最佳做法；

3. **认识到**防止初用大麻的方案应当针对青年特别是 12 岁以下的少年儿童，以便尽量扩大此类方案的效果；

4. **鼓励**会员国敦促医学研究界继续研究预防和治疗办法以消除吸用大麻对健康的影响；

5. **还鼓励**会员国采取综合的预防和治疗办法，酌情侧重于个人及其与同龄人、家属、学校和社区的关系；

6. **请**国际麻醉品管制局继续交流关于其监测工作的信息并报告关于会员国就大麻适用国际药物管制条约的情况；

7. **请**会员国尤其注意帮助孕妇意识到吸用大麻的种种危害；

8. **鼓励**会员国考虑开展有关易早年吸用大麻者的定性和定量研究，收集医院或专门保健机构当中与吸用大麻相关的可比和匿名就诊数据及治疗需求数据，以便更好地了解吸用大麻现象的程度；

9. **吁请**会员国进一步研究关于吸用大麻对健康的影响的现有科学和医学数据。

⁵ 联合国，《条约汇编》，第 520 卷，第 7515 号。