



## Consejo Económico y Social

Distr. general  
23 de abril de 2013  
Español  
Original: inglés

---

### Período de sesiones sustantivo de 2013

Ginebra, 1 a 26 de julio de 2013

**Cuestiones de coordinación y de programas  
y otras cuestiones: tabaco o salud**

### **Declaración presentada por la Fundación Eudes, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social**

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.



## **Declaración**

### **Plataforma para abordar el VIH/SIDA desde el punto de vista científico y tecnológico**

El segundo protocolo de la Fundación Eudes es sobre un estudio comparativo, ciego, aleatorio y longitudinal de dos fórmulas, “SCB” y “Prosure”, para ofrecer apoyo en materia de nutrición a pacientes con HIV/SIDA y tratamiento antirretroviral.

Respaldados por el comité ético y de investigación del hospital Manuel Gea González en la Ciudad de México, hemos estudiado a un total de 44 pacientes con VIH/SIDA, 33 hombres y 11 mujeres, que han recibido tratamiento antirretroviral, con una media de edad de 38 años.

Los grupos eran homogéneos cuando se realizaron las comparaciones y las variables estaban controladas.

Según las estadísticas de salud, el VIH conlleva, además de la inmunosupresión, un gran déficit nutricional y la pérdida progresiva de peso, así como la pérdida de apetito y la de masa muscular, que recibe el nombre de pérdida de resistencia muscular, lo que exige una reacción rápida. La intervención multidisciplinaria debe ser oportuna.

Ofrecer apoyo mediante los suplementos nutricionales que hemos desarrollado puede ayudar a que los pacientes aumenten su consumo de energía, aparte de los macronutrientes y micronutrientes que proporcionan.

Con referencia al mejoramiento del estado de nutrición y los parámetros bioquímicos, así como el peso, se observó una diferencia significativa al comparar las mediciones del peso de referencia con aquellas tomadas seis meses después para ambos suplementos. La fórmula “SCB” mostró un aumento de peso mayor, en concreto de 2 kilogramos frente a 1 kilogramo en el caso de “Prosure”. No se detectaron diferencias significativas entre los 2 suplementos después de 3 meses de tratamiento.

En el grupo que recibió los suplementos “SCB” se registró un porcentaje inferior de pacientes con carga vírica no detectable al final del tratamiento, lo cual indica un mejoramiento con respecto al estado nutricional y esto ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

---