



**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.: General
23 April 2013
Russian
Original: English

Основная сессия 2013 года

Женева, 1–26 июля 2013 года

Координация, программа и другие вопросы:

табак или здоровье

**Заявление, представленное Фондом Эудес — неправительственной
организацией, имеющей консультативный статус
при Экономическом и Социальном Совете**

Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распространяется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 Экономического и Социального Совета.



Заявление

Платформа для решения проблемы ВИЧ/СПИДа на основе научных и технологических разработок

Материалы второго протокола Фонда Эудес основываются на результатах сравнительного, непредвзятого, рандомизированного и длительного изучения двух препаратов, "SCB" и "Prosure", которые обеспечивают парентеральное питание пациентов с ВИЧ/СПИДом, проходящих курс антиретровирусной терапии.

С разрешения Комитета по научным исследованиям и этике при госпитале Мануэля Ги Гонсалеса в Мехико мы проводили исследования, наблюдая за 44 пациентами (33 мужчинами и 11 женщинами) с ВИЧ/СПИДом, средний возраст которых составлял 38 лет, получающих антиретровирусное лечение.

Сравнительные анализы проводились в однородных по составу группах, а переменные факторы находились под контролем.

Согласно данным статистики здравоохранения, ВИЧ-инфекция, помимо подавления иммунитета, вызывает серьезный дефицит питательных веществ в организме и прогрессирующую потерю веса, а также отсутствие аппетита и снижение мышечной массы, проявляющееся как снижение мышечной силы, что требует принятия неотложных мер. Необходимо своевременное обеспечение многопрофильного медицинского вмешательства.

Обеспечение парентеральным питанием при помощи разработанных нами пищевых добавок позволит увеличить уровень потребления энергии у пациентов на фоне дополнительного снабжения организма питательными макро- и микроэлементами.

Что касается улучшения нутритивного статуса и биохимических показателей, а также параметров веса, то при сравнении влияния обеих добавок наблюдались значительные расхождения между первоначальными показателями и показателями веса через шесть месяцев. Применение состава "SCB" продемонстрировало более значительное увеличение веса – на два килограмма – по сравнению с увеличением веса на один килограмм при использовании состава "Prosure". Если лечение продолжалось три месяца, то значительных различий в показателях между этими добавками не наблюдалось.

К концу курса лечения в группе, которая получала препарат "SCB", была отмечена более низкая доля пациентов с выявляемой вирусной нагрузкой, что указывает на улучшение нутритивного статуса, способствующего укреплению иммунной системы.